



中國醫藥大學附設醫院  
China Medical University Hospital

發行人：周德陽

總編輯：謝右文

編輯群：藥劑部

地 址：台中市育德路 2 號

電 話：(04)22052121-3154

# 藥 劑 快 訊

## 本期目次

### 一、藥品異動資訊 (P1)

1. 新進品項
2. 臨時採購
3. 更換廠牌
4. 包裝異動

### 二、預防用藥疏失--易混淆/形音相似藥品 (P7)

1. 外觀相近
2. 讀音相似


### 三、藥物安全警訊 (P9)


#### 1. TFDA 安全警訊摘要與本院現況

- (1) 含 Terlipressin 成份安全資訊風險溝通表


# 一、藥品異動資訊

## 1. 新進品項


日期	111.12.14	
學名/規格	Avanafil 200mg/Tab	
商品名	Spedra 賽倍達錠	
適應症	治療成年男性勃起功能障礙。	

日期	111.12.16	
學名/規格	Buspirone 5mg/Tab	
商品名	Sepirone 怡必隆錠	
適應症	焦慮狀態。	

## 2. 臨時採購

日期	111.12.09	
學名/規格	Oxitriptan 100 mg/Cap	
商品名	5-HTP 100 mg/Cap 5-羥基色氨酸膠囊	
適應症	治療BH4缺乏型苯酮尿症患者	
備註	兒童醫院小兒遺傳科臨採品項	

日期	111.12.26	
學名/規格	Each pack: Crystalline Glucosamine Sulphate 1884mg (Glucosamine Sulphate 1500mg, Sodium Chloride 384mg)	
商品名	Viartril-s powder 1500mg/Pack 維骨力加強型口服溶液用粉劑	
適應症	緩解退化性關節炎之疼痛。	
備註	社區暨家庭醫學部高齡醫學科臨採藥品。	

日期	112.01.04	
學名/規格	Each Extended-Release tab contains: <b>Bupropion hydrochloride 90mg and Naltrexone hydrochloride 8mg.</b>	
商品名	<b>Contrave Extended-Release Tablets</b> 康纖芙持續性釋放錠	
適應症	用於體重控制，做為低熱量飲食及增加體能活動外之輔助療法，適用對象為成人病人且初始身體質量指數(BMI)為：● $\geq 30 \text{ Kg/m}^2$ ，或● $\geq 27 \text{ Kg/m}^2$ 至 $<30 \text{ Kg/m}^2$ ，且病人至少有一項體重相關共病症，例如第二型糖尿病、血脂異常或已獲控制之高血壓。	
備註	家醫科臨採藥品。	

### 3.更換廠牌


日期	111.12.08	變更項目	由亞培廠變華興廠
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Clarithromycin 500mg/Tab		
商品名	Klaricid F.C. 500mg/Tab 開羅理黴素膜衣錠	Ulicin 500mg/Tab 幽立息膜衣錠	
適應症	上下呼吸道有感受性細菌所引起之感染症，可與 omeprazole 併用治療與幽門螺旋桿菌(H.Pylori)有關之十二指腸潰瘍。		
備註	原品項缺貨進用暫代。		

日期	111.12.26	變更項目	由永信廠變安沛廠
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Azathioprine 50mg/Tab		
商品名	Asazipam 安思平膜衣錠	Imuran 移護寧	
適應症	腎臟移植手術防止排斥作用的輔助療法、全身性紅斑狼瘡、重度風濕性關節炎、急慢性白血病		
備註	原品項缺貨進用暫代。		

日期	112.01.04	變更項目	由裕利廠變元宇宙廠
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Benzydamine HCL 3 mg/mL		
商品名	Diffiam forte anti-inflammatory throat spray 得伏寧加強消炎噴液劑	Coserrin 克炎寧加強消炎噴液劑	
適應症	舒解口腔及咽喉疼痛，包括下列疾病或症狀引起的疼痛：扁桃腺炎、喉嚨痛、放射治療引起的黏膜炎、鵝口瘡潰瘍、口腔與牙周手術後疼痛。		
備註	原品項缺貨進用暫代。		



日期	112.01.12	變更項目	由永信廠變健喬信元廠
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Metformin HCl 500 mg/Tab		
商品名	Volv 500mg/Tab 豪樂錠	Ankomin 500mg/Tab 美克糖膜衣錠	
適應症	糖尿病。		
備註	原品項缺貨進用暫代。		

### 4. 包裝異動

日期	111.12.14	變更項目	變更為排裝
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Hydralazine 25mg/Tab		
商品名	Apolin 哈伯寧錠		
適應症	高血壓		



## 二、預防用藥疏失-混淆/形音相似藥

### 1. 外觀相近

<p>圖片</p>		
<p>學名規格</p>	<p><b>Soonmelt (Amoxicillin/Clavulanate)複方</b></p>	<p><b>Culin 500mg/Vial (Imipenem+Cilastatin)</b></p>
<p>中文商品名</p>	<p>雙合黴素</p>	<p>庫寧靜脈乾粉注射劑</p>
<p>商品名</p>	<p>Soonmelt 1.2g/Vial</p>	<p>Culin 500mg/Vial</p>



## 2. 讀音相似

<p>圖片</p>			
			
<p>圖例位置</p>	<p>左</p>	<p>右</p>	<p>下</p>
<p>學名規格</p>	<p>SiLyMarin 150mg/Cap</p>	<p><b>Biogen Tab(複方)</b></p>	<p><b>Biogaia 錠劑</b> 30Tabs/Box</p>
<p>中文商品名</p>	<p><b>保肝勇膠囊</b></p>	<p><b>保爾健錠</b></p>	<p><b>寶乖亞錠劑</b></p>
<p>商品名</p>	<p><b>Bao-gan 150mg/Cap</b></p>	<p><b>Biogen Tab(複方)</b></p>	<p><b>Biogaia 錠劑</b> 30Tabs/Box</p>

## 三、藥物安全警訊

### 1. TFDA 安全警訊摘要與本院現況

#### (1) 含 Terlipressin 成份安全資訊風險溝通表

2022/11/11 歐洲醫藥管理局 (EMA) 發布使用含 terlipressin 成分藥品於第一型肝腎症候群 (type 1 hepatorenal syndrome, type 1 HRS) 病人，可能具發生嚴重呼吸衰竭及敗血症風險之安全資訊，並建議醫療人員改以連續輸注之方式給藥，及於仿單加刊相關警語。

- i. 我國目前核准含 terlipressin 成分藥品許可證共 4 張，其中文仿單於「用法用量」段刊載「第一型肝腎症候群：每 24 小時，3 到 4 毫克 terlipressin acetate 分成 3 或 4 次注射」，並於「警告及注意事項」段刊載「為了避免注射部位局部壞死，一定要靜脈注射。高血壓、已知有心臟病冠狀動脈功能不全、腎功能不全、腦血管或周圍血管疾病、呼吸衰竭的病人治療時要特別小心」，惟未提及避免用於晚期慢性肝病急性惡化與晚期腎衰竭之病人、嚴重呼吸衰竭(可能致命)、敗血症風險，及建議連續輸注方式以降低相關嚴重不良反應等安全性資訊。

#### 醫療人員應注意事項：

- i. 臨床研究中觀察到含 terlipressin 成分藥品用於治療第一型肝腎症候群時，發生呼吸衰竭風險高於先前已知的風險程度；此外，敗血症亦為使用 terlipressin 於治療上述族群之風險。
- ii. 含 terlipressin 成分藥品應避免用於晚期腎功能不全 (血清肌酸酐  $\text{SCr} \geq 442 \mu\text{mol/l}$  (5.0 mg/dl))、慢性肝衰竭急性惡化 (acute-on-chronic liver failure, ACLF) 達第三級及/或末期肝病評分模型 (model for end-stage liver disease, MELD) 分數  $\geq 39$  分之病人，除非其臨床效益大於風險，方可考慮使用 terlipressin 於上述族群。
- iii. 若病人有呼吸困難狀況，或自身呼吸相關疾病有惡化之情形時，在開始使用 terlipressin 前應先穩定相關病情，並於 terlipressin 治療期間密切監控。如果病人出現呼吸相關症狀，可考量降低白蛋白劑量；若症狀嚴重或未有改善，應停用含 terlipressin 成分藥品。
- iv. 此外，應密切監測病人是否出現感染相關症狀。
- v. 建議可考慮以靜脈連續輸注方式取代快速靜脈注射 (bolus injection) 之方式給藥，以降低發生嚴重不良反應的風險。

#### 本院現況與民眾應注意事項：

- i. 含 terlipressin 成分藥品用於治療第一型肝腎症候群治療時，可能會發生

- 呼吸衰竭及敗血症等風險。
- ii. 若非必要，晚期腎衰竭及晚期慢性肝病急性惡化的病人，應避免使用含 terlipressin 成分藥品來治療第一型肝腎症候群。
  - iii. 患有呼吸相關疾病的病人，在開始使用 terlipressin 前應接受治療以控制病情。
  - iv. 接受 terlipressin 治療前及治療期間，應接受醫療人員密切監測呼吸衰竭、感染的徵兆及症狀，並視需要接受適當的治療。
  - v. 若您對用藥有任何疑問或疑慮請諮詢醫療人員。

**本院含 terlipressin 成份之藥品：**

藥品代碼	商品名	成份名	中文商品名
IGLYPRE1	GLYPRESSIN	Terlipressin acetate 1mg/8.5mL/Amp	可利新注射劑