



中國醫藥大學附設醫院
China Medical University Hospital

發行人：周德陽

總編輯：謝右文

編輯群：藥劑部

地 址：台中市育德路 2 號

電 話：(04)22052121-3154

藥 劑 快 訊

本期目次

一、藥品異動資訊 (P1)

1. 新進品項
2. 臨時採購
3. 更換廠牌
4. 包裝異動

二、預防用藥疏失--易混淆/形音相似藥品 (P14)

1. 名稱相似


三、藥物安全警訊 (P15)

1. TFDA 安全警訊摘要與本院現況

(1) 含 Rituximab 成份安全資訊風險溝通表


一、藥品異動資訊


1. 新進品項

日期	112.04.13	
學名/規格	Avanafil 200mg/Tab	
商品名	Jynneos 猴痘疫苗	
適應症	猴痘暴露前預防(PrEP)、暴露後預防(PEP)	



2. 臨時採購



日期	112.04.26	
學名/規格	Abemaciclib 200mg/Tab	
商品名	Verzenio 捷癌寧膜衣錠	
適應症	<p>1. 早期乳癌：併用內分泌療法 (tamoxifen 或芳香環酶抑制劑)，可做為荷爾蒙受體(HR)陽性、第二型人類表皮生長因子受體(HER2)陰性、淋巴結陽性，高復發風險之早期乳癌成年病人的輔助治療。</p> <p>2. 晚期乳癌： (1) 併用芳香環酶抑制劑(aromatase inhibitor)，可做為治療荷爾蒙受體(HR)陽性、第二型人類表皮生長因子受體(HER2)陰性之晚期或轉移性乳癌之停經後婦女及男性的第一線內分泌療法(endocrine-based therapy)。(2) 併用 fulvestrant，可治療荷爾蒙受體(HR)陽性、第二型人類表皮生長因子受體(HER2)陰性，且接受內分泌療法後疾病惡化之晚期或轉移性乳癌的成人病人。(3) 單獨用於治療荷爾蒙受體(HR)陽性、第二型人類表皮生長因子受體(HER2)陰性，曾經接受過內分泌治療及於轉移後接受化學治療後又發生疾病惡化之晚期或轉移性乳癌的成人病人。</p>	
備註	血液腫瘤、乳房外科臨採品項	



日期	112.05.02	
學名/規格	Polatumab vedotin 30mg/Vial	
商品名	Polivy 保癌寧凍晶注射劑	
適應症	1.與 rituximab、cyclophosphamide、doxorubicin 和 prednisone (R-CHP)併用，適用於治療先前未接受過治療之瀰漫性大型 B 細胞淋巴瘤(DLBCL)成人病人。 2.與 bendamustine 和 rituximab 併用，適用於治療復發型(relapsed)或難治型(refractory)且不適合接受造血幹細胞移植的瀰漫性大型 B 細胞淋巴瘤(DLBCL)病人。	
備註	血液腫瘤科臨採	



日期	112.05.03	
學名/規格	Decitabine 50mg/Vial	
商品名	Dacogen 50mg/Vial 達珂凍晶注射劑	
適應症	(1) 適用於治療不適合進行標準誘導化學療法之新診斷出患有原發性或續發性急性骨髓性白血病成人病人(AML，依據世界衛生組織(WHO)分類)。須符合 Poor-or intermediate-risk Cytogenetics，且不適合用於 Acute Promyelocytic Leukemia (M3 Classification)。 (2) 適用於治療骨髓化生不良症候群(MDS)成人病人，包括先前曾接受治療及未曾接受治療、所有 French-American-British 亞型之原發性與續發性 MDS (頑固性貧血、環形鐵粒幼細胞的頑固性貧血、頑固性貧血併有過量芽細胞、頑固性貧血併有過量芽細胞轉變型、以及慢性骨髓單核球性白血病)、以及國際預後評分系統分類為中度危險-1、中度危險-2 與高危險的病人。	
備註	內科部血液腫瘤科臨採品項	

3.更換廠牌

日期	112.04.24	變更項目	健亞廠變大昌華嘉廠
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	15mg/3mL/Amp	Midazolam 15mg/3mL/Amp	
商品名	Midazo 15mg/3mL/Amp 米達諾注射劑	Dormicum 導眠靜注射劑	
適應症	知覺鎮靜、急救加護病房鎮靜、麻醉誘導及維持、手術前給藥。		
備註	原品項停產，進用替代。		

日期	112.05.11	變更項目	默沙東廠變中化廠
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Montelukast Sodium 4 mg/Tab		
商品名	Singulair 欣流咀嚼錠	Monteka 蒙地卡咀嚼錠	
適應症	適用於預防與長期治療成人及小兒的氣喘，包含預防日間及夜間氣喘症狀，及防止運動引起的支氣管收縮。用於先前已接受過其他抗過敏藥品，但療效不佳或無法耐受之成人及小兒的日間及夜間的過敏性鼻炎(Allergic Rhinitis)。		
備註	原品項缺貨，進用暫代。		

日期	112.05.11	變更項目	中化廠變輝瑞廠
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Hydrocortisone 100 mg/vial		
商品名	HydroCortisone 舒爾體爽注射劑	Solu-cortef 舒汝固體膚減菌注射粉劑	
適應症	腎上腺皮質機能不全、劇列休克、膠原疾病（全身性紅斑性狼瘡）過敏反應（支氣管氣喘）、過敏性皮膚疾患（天皰瘡、剝脫性皮膚炎）。		
備註	原品項缺貨，進用暫代。		



日期	112.05.17	變更項目	費森尤斯卡比廠變專案進口
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Cisatracurium 10mg/5mL/Amp		
商品名	Cisatracurium "卡比"肌鬆弛注射液	Cisatracurium-kalcex	
適應症	本品為一高選擇性及競爭性的非去極化神經肌肉阻斷劑。可作為全身麻醉之輔助劑或加護病房使用，用以鬆弛骨骼肌，幫助氣管插管及與人工呼吸器的協調。		
備註	原品項缺貨，進用暫代。		

日期	112.05.19	變更項目	由 NORGINE 廠變國嘉廠
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Normacol 7 g/pack, each pack contains: Sterculia 62% and Frangulia 8%	Psyllium husk 6g/Pack	
商品名	Normacol plus granules 7g/Pack 樂瑪可顆粒劑	Kocel 康纖散劑	
適應症	緩解便秘。	軟便。	
備註	原品項缺貨進用暫代。		



日期	112.05.24	變更項目	由晟德廠變晟德廠
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Each mL contains: Codeine phosphate 0.48 mgL, Chlorpheniramine maleate 0.25 mg, Methylephedrine dl- hcl 1.6 mg, Glycyrrhizic acid (=glycyrrhetic acid glycoside) 0.25 mg	Each mL contains : Codeine Phosphate 0.48 mg, dl-Methylephedrine Hydrochloride 1.0 mg, Chlorpheniramine Maleate 0.2 mg, Potassium Guaiacolsulfonate 4.5 mg	
商品名	Consrine 康是寧糖漿 康是寧糖漿	Dinco syrup 停咳糖漿 停咳糖漿	
適應症	鎮咳、祛痰。		
備註	原品項停產，進用替代。		

日期	112.05.25	變更項目	由禮來廠變安星廠
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Aminophylline 250 mg/10ml/Amp		
商品名	Asiphylline 心安寧注射液	Aminophylline 氨基非林注射液	
適應症	心因性、支氣管氣喘及支氣管痙攣。		
備註	原品項缺貨，進用暫代。		



日期	112.05.26	變更項目	綠十字廠變專案進口
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Urokinase 60000 IU/Vial		
商品名	UROKINASE-GREEN CROSS INJ. "綠十字"血栓溶素注射劑 60,000 國際單位	Urokinase(栓塞) 60000 IU/Vial	
適應症	急性冠狀動脈栓塞、清潔靜脈導管、急性肺栓塞。末梢動脈、靜脈 栓塞症。		
備註	原品項缺貨，進用暫代。		


日期	112.05.29		變更項目	由禮來廠變 APOTEX 廠
對照	舊		新	
圖片				
學名/規格	Atomoxetine HCl 10mg/Cap			
商品名	Strattera 思銳膠囊	Apo -Atomoxetine HCl 安保思定膠囊		
適應症	注意力缺損/過動症(ADHD)。			
備註	原品項停產，進用替代。			



4. 包裝異動



日期	112.05.03	變更項目	外盒包裝變更
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Follitropin alfa 450 IU/0.75mL/Pen		
商品名	GONAL-F 450IU/0.75ML solution for injection in pre-filled pen 果納芬注射筆 450 國際單位/0.75 毫升		
適應症	<p>女性患者 (1)婦女經 CLOMIPHENE CITRATE 治療，仍無法排卵者(含多囊性卵巢症，PCOD)。(2)對於實施人工生殖協助技術(ART)，如體外受精(IVF)，配子輸卵管植入(GIFT)，合子輸卵管植入(ZIFT)的病人，可刺激其多濾泡發育。(3)與黃體刺激素(LH)併用，使用於嚴重缺乏黃體刺激素與濾泡刺激素患者的濾泡刺激成長。男性患者 治療男性對於患有先天或後天性腺刺激素不足之性腺功能低下症，併用人類絨毛膜性腺刺激素(hCG)，刺激精子生成。</p>		

日期	112.05.08	變更項目	包裝印刷變更
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	polyethylene glycol 4000 10g/Pack		
商品名	Forlax 樂疏口服懸液用粉劑		
適應症	成人和八歲及以上兒童便秘的症狀治療。		

日期	112.05.09	變更項目	排裝顆數及印刷變更
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Bisacodyl 5 mg/腸溶糖衣錠		
商品名	Dulcolax enteric sugar coated tablet 5mg		
適應症	暫時緩解便秘，診斷及手術前清腸。		



日期	112.05.15	變更項目	排裝印刷變更
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Eltrombopag olamine 25 mg/Tab		
商品名	Revolade film-coated tablets 25mg 返利凝 25 毫克膜衣錠		
適應症	<p>1.用於 6 歲(含)以上對於其他治療(例如:類固醇、免疫球蛋白等)失敗之慢性免疫性血小板缺乏紫斑症(ITP)病人。2.用於慢性 C 型肝炎病毒(HCV)感染的成年病人,治療其因血小板減少症而無法順利展開及持續干擾素治療。3.與標準免疫抑制療法併用,用於成年及 12 歲(含)以上嚴重再生不良性貧血(SAA)病人的第一線療法。4.適用在對於免疫抑制療法反應不佳的嚴重再生不良性貧血(SAA)病人。</p>		

日期	112.05.15	變更項目	排裝印刷變更
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Propafenone 150mg/Tab		
商品名	Rytmonorm 心利正膜衣錠		
適應症	心室性心搏過速、上心室性心搏過速、W-P-W 症候群。		

日期	112.05.18	變更項目	名稱變更
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Isoproterenol 0.2mg/mL/Amp		
商品名	Proternol-L 普樂他諾	Isoproternol 樂普他諾	
適應症	有症狀之高度房室傳導阻斷、(阿丹斯史妥克斯徵候群)支氣管氣喘及支氣管痙攣、休克、心肌衰竭		

二、預防用藥疏失-混淆/形音相似藥

1. 名稱相似

<p>圖片</p>	 <p>The image shows the packaging and tablets for Lamotrigine 50mg/Tab. On the left is a blister pack with 12 tablets. In the center is a blister pack with 6 tablets. On the right are two individual tablets, one showing '50' and the other showing 'GSK'. A red box highlights the tablets and the text '樂命達錠 50毫克 Lamictal® LAMOTRIGINE 50 mg'.</p>	 <p>The image shows the packaging and tablets for Lurasidone HCL 40mg/Tab. On the left is a blister pack with 12 tablets. On the right is a blister pack with 6 tablets. A red box highlights two individual tablets, one showing 'L' and the other showing '40'. The text '新包裝' (New packaging) is written in red above the tablets.</p>
<p>學名規格</p>	<p>Lamotrigine 50mg/Tab</p>	<p>Lurasidone HCL 40mg/Tab</p>
<p>中文商品名</p>	<p>樂命達錠</p>	<p>樂途達錠</p>
<p>商品名</p>	<p>Lamictal 50mg/Tab</p>	<p>Latuda 40mg/Tab</p>

三、藥物安全警訊

1. TFDA 安全警訊摘要與本院現況

(1) 含 rituximab 成份安全資訊風險溝通表

Rituximab 因其抑制 B 淋巴細胞表面 CD20 抗原而導致 B 細胞凋亡之藥理作用，可能增加病人發生 COVID-19 重症風險並延長感染時程；全國藥物不良反應通報中心已接獲數例相關嚴重不良反應通報，其中包含有死亡案例。

- i. 經查，我國核准含 rituximab 成分藥品許可證共 6 張，其中生物相似性藥品共 4 張，核准之適應症主要用於癌症及風濕免疫相關疾病治療，其中文仿單於「警語與注意事項-感染」及「不良反應」段落刊載病毒感染相關敘述，惟並未特別提及 SARS-CoV-2 感染相關安全性資訊。
- ii. 考量 rituximab 可能增加 COVID-19 重症風險並延長感染時程一事，可能非為臨床醫療人員所熟知之風險，且該不良反應可能造成嚴重或死亡之後果，為保障民眾用藥安全，本署特發布此風險溝通表以提醒醫療人員注意相關風險，並持續追蹤相關安全性訊號。

醫療人員應注意事項：

- i. Rituximab 之藥理作用為抑制 B 淋巴細胞表面 CD20 抗原而導致 B 細胞凋亡，該機轉可能增加病人發生 COVID-19 重症風險並延長感染時程；全國藥物不良反應通報中心已接獲數例相關嚴重不良反應通報，其中包含有死亡案例。
- ii. 醫療人員於處方 rituximab 時，請評估病人之感染風險並謹慎用藥，並提醒病人使用 rituximab 可能增加 COVID-19 重症風險，如有感染相關之症狀或徵候，務必立即就醫。
- iii. 鼓勵病人接種 COVID-19 疫苗，並依臨床狀況評估合適之接種時程、疫苗、劑次，以及 rituximab 之使用時機與劑量。

本院現況與民眾應注意事項：

- i. 使用 rituximab 藥品可能增加 COVID-19 重症風險並延長感染時程。
- ii. 在您使用 rituximab 藥品期間或使用後，若有發生疑似感染症相關症狀，如發燒、流鼻水、咽喉炎、咳嗽、疲倦、全身痠痛、頭痛等症狀，請立即就醫或告知醫療人員。
- iii. 尚未接種 COVID-19 疫苗或尚未完成接種系列之病人，請與您的醫師討論適合您的接種時程、疫苗、劑次，以及 rituximab 合適的使用時機與劑量。

本院含 rituximab 成份之藥品：

藥品代碼	商品名	成份名	中文商品名
IRITUX53	Truxima	Rituximab 500mg/50mL/Vial	妥利希瑪注射劑
IRITUX13	Truxima	Rituximab 100mg/10mL/Vial	妥利希瑪注射劑
IRITUX52	Rixathon	Rituximab 500mg/50mL/Vial	洛希隆注射劑
IRITUX4	MabThera	Rituximab SC 1400mg/Vial	莫須瘤皮下注射劑
IRITUX11	Mabthera	Rituximab 100mg/10mL/Vial	莫須瘤注射劑
IRITUX51	Mabthera	Rituximab 500mg/50mL/Vial	莫須瘤注射劑